

Alveolitis purulenta

Alveolitis purulenta je hnisavý zánět zubního lůžka, který často vzniká z neošetřené alveolitis sicca nebo jako komplikace po extrakci zubu. Zánět se projevuje třetí až čtvrtý den po extrakci. Častěji se vyskytuje u zubů **v dolní čelisti**, zejména pak u třetích molárů (nejnižší místo mandibuly). Dříve byla alveolitida nazývána jako tzv. „*dolor post extractionem*“ = bolest po extrakci.

Příčiny

Infekce koagula infikovanými granulacemi ponechanými v periapikálním prostoru. Další z možných příčin jsou ponechané zalomené kořeny, které jsou infikované, nebo zhmoždění lůžka při extrakci.

Projevy

- Lůžko je vyplněné **páchnoucím koagulem** šedozelenavé barvy.
- Okolí lůžka bývá zduřelé a zarudlé.
- Teplota může být zvýšená až 38 °C, lymfatické uzliny jsou zvětšené.
- Foetor ex ore.
- Pokud zánět pronikne do spongiozy kosti, hrozí riziko rozvoje osteomyelitidy.

Terapie

Nutná je **exkochleace lůžka** v lokální anestezii a následné **odstranění granulací**, po exkochleaci se lůžko vyplní krví a vznikne nové krevní koagulum. Následuje antiseptický výplach, tamponáda lůžka mulovým drénem s antiseptiky a vazelínou nebo tamponáda pastou (např. Alveogyl). Proti silné bolesti je vhodné podávat analgetika. Antibiotika nasazujeme pouze při vysokých teplotách.

Odkazy

Související články

- Alveolitis sicca
- Extrakce zubu
- Komplikace při extrakci zubu
- Záněty v okolí horní čelisti

Použitá literatura

- WEBER, Thomas. *Memorix zubního lékařství : překlad 2. vydání, 279 vyobrazení*. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 81 s. ISBN 80-247-1017-X.
- TOMAN, Jaroslav. *Ústní a čelistní chirurgie*. 1. vydání. Avicenum, 1972.