

Blefarospasmus

Jako **blefarospasmus** označujeme **mimovolní tonické a spastické kontrakce očních víček** trvající několik sekund až minut, které jsou způsobeny křečovitým svíráním m. orbicularis oculi.

Etiologie

Příčinou může být

- encefalitida,
- Bellova obrna,
- podráždění trojklaného nervu,
- dráždění u onemocnění víček, spojivky a rohovky (např. cizí těleso).

Klinický obraz

Intermitentní forma

Postihuje většinou starší pacienty. Jednotlivé záchvaty se dostavují v různých intervalech, mohou být idiopatické nebo vyvolány různými podněty (např. kýchnutí, smích atd.)

Stálá forma

Bývá spojena se slzením, světloplachostí a oděrkami na okrajích očních víček.

Terapie

Terapeutických metod je více. V první řadě je nutné odstranit nebo léčit vyvolávající příčinu, pokud to jde. Při přetrvávání problému pacientovi můžeme aplikovat botulotoxin, nevýhodou je nutnost opakování po 2–3 měsících. V extrémních případech, kdy **může dojít až k trvalému sevření oční štěrbiny**, lze podávat sedativa, chirurgicky oslabit vlákna m. orbicularis oculi či přetrhnout vlákna větve n. facialis. ^[1]

Odkazy

Související články

- Poruchy postavení víček
- Dystonie

Externí odkazy

- Video blefarospasmu (<https://www.youtube.com/watch?v=pn0nKoMMZI8>)

Použitá literatura

- ROZSÍVAL, Pavel, et al. *Oční lékařství*. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.

Reference

- ROZSÍVAL, Pavel, et al. *Oční lékařství*. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.

Blefarospasmus	
Blepharospasm	
Klinický obraz	tonické a spastické kontrakce očních víček
Léčba	botulotoxin (symptomatická)
Klasifikace a odkazy	
MKN	G24.5 (https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/G24.5)
MeSH ID	D001764 (https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=D001764)
OMIM	606798 (https://omim.org/entry/606798)
MedlinePlus	000756 (https://medlineplus.gov/ency/article/000756.htm)
Medscape	1212176 (https://emedicine.medscape.com/article/1212176-overview)