

Periferní cyanóza

Periferní cyanóza je typ cyanózy, který se projevuje nejvíce na akrech a kolem úst. Akra jsou chladná, sliznice růžové. Příčinou je pomalý průtok krve periferií, který vede k větší desaturaci periferní krve (např. při městnání krve při srdečním selhávání). Cyanóza se projeví pouze u normálního, nebo zvýšeného hematokritu (polyglobulie). U anemických pacientů nevzniká!

Často se objevuje u novorozenců v prvních dnech života, zřejmě díky nestabilní vazomotorické reakci cév a novorozenecké polyglobulii.^[1]

Odkazy

Související články

- Centrální cyanóza
- Cyanóza (patofyziologie)

Reference

1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. *Preklinická pediatrie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 113. ISBN 978-80-7262-438-6.



Cyanóza u dvouhodinového novorozence



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Perifern%C3%AD_cyan%C3%B3za&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.