

Periproktální píštěl

Periproktální píštěl (fistula) je patologické spojení mezi kůží perinea a rektem či análním kanálem. Vzniká 8x častěji u mužů než u žen. Celková prevalence je cca 7/100 000 lidí. Průměrný věk je 40 let.

Etiologie

V oblasti rekta a hráze se vyskytují i fistuly, které s konečníkem nemusí souviset (z ženského genitálu, uretry, prostaty). Ty, které vychází z anální krajiny a konečníku, můžeme dělit na vrozené a získané.

- **Kongenitální píštěle** – jsou součástí anomálií vývoje konečníku.
- **Získané píštěle:**
 - **80-90 %** vzniká na podkladě periproktálních abscesů vzniklých infekcí análních žláz (tzv. kryptoglandulární teorie).
 - **10-20 %** má jinou etiologii: dermoidní cysta, perineální trauma, Crohnova nemoc, záněty v oblasti malé pánve, TBC, karcinomy, radiační léčba, aktinomykóza, chlamydiové infekce, či jiné sexuálně přenosné choroby.
- **Vzácnější píštěle** – podkovovitá píštěl (horsehoe fistula) má dlouhé vedlejší choboty obkružující anální kanál, nejčastěji je transsfinkterická. Při nerozpoznání často recidivuje.

Dělení

Píštěle můžeme dělit podle jejich **vztahu k rektu** – na **konečníkové** a **periproktální** (perianální). Dále je dělíme na **úplné** a **neúplné** podle toho, zda mají zevní i vnitřní ústí (úplné), či jen jedno (neúplné, častěji zevní). **Složitá** (komplikovaná) píštěl je taková, jejíž vnitřní ústí sahá nad puborektální sval nebo její trakt obkružuje více než 3/4 zevního sfinkteru.


Podle anatomické polohy traktu dělíme píštěle na:

- **intrasfinkterické** (podkožní, podslizniční),
- **intersfinkterické**,
- **transsfinkterické**,
- **extrasfinkterické**.

Dle Parkse (intrasfinkterické, transsfinkterické, suprasfinkterické, extrasfinkterické).

Příznaky

Fistuly se projevují **sekrecí**, **svěděním** a **mokváním** okolí, **znečištěním** prádla stolicí či hnisem. **Bolest** vzniká při stagnaci obsahu při zástavě drenáže. Může se vyskytnout i otok a **krvácení**, pocity **plnosti** a **tlaku** v konečníku. Mohou se objevit také **subfebrilie**. Časté je střídání asymptomatických období se symptomatickými v různě dlouhých intervalech. Vnitřní píštěl se klinicky **nemusí projevit** vůbec.




Periproktální píštěle:
1) intrasfinkterická
2) intersfinkterická
3) transsfinkterická
4) extrasfinkterická
5) suprasfinkterická
a) anální kanál
b) konečník
c) vnitřní svěrač
d) vnější svěrač
e) m. levator ani

Diagnostika

Významná je důkladná anamnéza se zaměřením na **záněty anorekta a abscesy** v této oblasti v minulosti, pátrání po příznacích Crohnovy choroby. Největší význam má fyzikální vyšetření:

- **Aspekce** – nacházíme zevní ústí píštěle. Píštěle mohou mít více zevních ústí, ale obvykle mírají pouze jedno vnitřní. Vzdálnost od anu nám může napovídat o jaký typ fistuly se jedná. Blíže k anu – spíš subkutánní, dál od anu – více komplikované fistuly.



Goodsallovo pravidlo

Goodsallovo pravidlo – vedeme-li anem **transverzální linii**, potom fistuly, jejichž zevní ústí je **dorzálně** od této linie, vedou obloukovitě a mají vnitřní ústí na č. 6 (střední zadní čáře). Fistuly, které mají zevní ústí **ventrálně** vedou rovně a ústí radiálně na přibližně stejně pozici. Goodsallovo pravidlo ale neplatí na 100 %, více výchylek je u žen.

- **Palpaci** – pohmatem lze zjistit tužší pruh, induraci v okolí. Při vyšetření per rectum můžeme někdy nahmatat i vnitřní ústí.
- **Anoskopie, rektoskopie, koloskopie** – umožní zhodnotit sliznici rekta, umístění vnitřního ústí píštěle, vyloučení tumoru či nespecifických střevních zánětů.
- **Sondáž píštěle** – paličkovitou sondou nenásilně zjišťujeme průběh píštěle, při velké bolestivosti se provádí peroperačně v anestézii. Při nejasném vnitřním ústí můžeme použít roztok peroxidu vodíku, betadine či methylénovou modř.

- **Fistulografie** – kontrastní látka se používá u fistul při Crohnově chorobě, recidivách či komplikovaném průběhu. Zobrazíme tak větvení, průběh i slepé choboty. Výtečnost vyšetření je však nízká.
- **US** – endosonografické vyšetření se v poslední době široce používá a nahrazuje CT vyšetření, které je pro diagnostiku málo výtečné. US lze užít k primární diagnostice i peroperačně.
- **NMR** – nukleární magnetická rezonance je nejpřesnější metodou pro zobrazení **komplikovaných píštěl** zejména při Crohnově chorobě.

Léčba

Historie léčby píštěl dosahuje až do **starověku**. Hippokratés využíval již tehdy metody podobné dnešním, provlékal píštělem koňské žíně (seton), zatěžoval vlasce kameny (cutting seton). První ucelené pojednání o této problematice pochází **ze 14. století** (J. Ardern) a píštěle se nevyhnuly ani francouzskému králi Ludvíku XIV.

Konzervativní techniky:

- Dříve se hojně využívala konzervativní terapie s **aplikací sklerotizujících láték** (př. AgNO₃), pro špatné výsledky, se však již neužívá.
- Dnes se využívají různá **fibrinová tkáňová lepidla**, nejúspěšnější v léčbě jsou tkáňová lepidla s intraadhezivními ATB (další – autologní t.l., t.l. bez ATB).

Operační techniky:

- **Fistulotomie, fistulektomie (lay open)** – tyto podobné zákroky se provádí u jednoduchých nízkých píštěl bez komplikovaného průběhu. Po ozřejmění traktu a vnitřního ústí se zavede do píštěle žlábková sonda a provede se discize píštěle, excize okolní tkáně a exkochleace spodiny, může se odebrat vzorek tkáně na histologii. Rána se nechá sekundárnímu hojení, či se provede marsupializace. Při fistulektomii se provede excize na sondě. U této techniky je ovšem větší tkáňový defekt a větší procento pooperačních inkontinencí. Existují proto různé modifikace operací se zachováním celistvosti zevního svěrače (Parksova fistulektomie).
- **Seton technika** – (Hippokratova elastická ligatura, cutting seton) je technika, která se užívá u vyšších transsfinkterických, extra- a suprasfinkterických píštěl. Po identifikaci zevního a vnitřního ústí se píštěl provlékne **nevstřebatelné** nejlépe elastické vlákno (silikon, pryž) a pod mírným tahem se zauzlí. Vlákno se postupně prořezává sfinkterem, musí se **dotahovat**, aby zůstal přibližně stejný tah. Hojení optimálně trvá 6–8 týdnů, za prořezaným vlákнем se postupně tvoří **fibrotická tkáň**. Technika se může v modifikaci vést podkožím. Indikace se musí zvážit, větší riziko inkontinence je u ventrálních píštěl u žen.
- U složitých, mnohočetných píštěl a u píštěl při Crohnově chorobě se užívá **seton drenáž**. Tato technika je podobná, avšak vlákno je píštěl zavedeno **volně bez tahu**. Lze tak užít i neelastické materiály. Díky seton drenáži píštěl postupně vyzravá, poté následuje její excize. Při Crohnově chorobě se užívají trasovací ligatury pro dlouhodobou (týdny až měsíce) drenáž píštěl s abscesy.
- **Slizniční posuvný lalok (advancement flap)** – má nejlepší výsledky, může se použít takřka u všech typů píštěl, výhodný je u komplikovaných fistul. Hojení probíhá výhodně **per primam**. Nezpůsobuje anální deformace. Metoda spočívá ve fistulektomii zevně od svěračů, excizi vnitřního ústí, která je následována konstrukcí **posuvného slizničního laloku**, jenž je vtažen do defektu a fixován stehy po obvodu. Zevní defekt se nechá sekundárnímu hojení.
- **Anal fistula plug** – použití speciálních biologických análních zátek, které umožní zhojení píštěle.

Nové operační techniky:

- **LIFT** – Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract – nová, relativně jednodušší technika intersfinkterického podvazu.
- **VAAFT** – Video Assisted Anal Fistula Treatment – endoskopické prohlížení traktu píštěle (fistuloskopie) s vizualizací větvení a možností ošetření vnitřního ústí pomocí **stapleru** či **cutтерu**.
- **Koagulace píštěle pomocí RFA či laseru**.

Odkazy

Související články

- Crohnova choroba

Zdroje

- HORÁK, Ladislav, et al. *Praktická proktologie*. 1. vydání. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3595-5.
- REJCHRT, Stanislav, et al. Přístup k pacientu s píštělem gastrointestinálního traktu. *Folia Gastroenterologica et Hepatologica* [online]. 2007, roč. 5, vol. 5, no. 1, s. 19-29, dostupné také z <<http://www.pro-folia.org/files/1/2007/1/rejchrt.pdf>>.
- BARTOŠKA, Petr, et al. *Perianální píštěl* [online]. ZdravíE15, ©2007. [cit. 2014-04-01].

<<https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/perianalni-pistele-319038>>.

Externí stránky

- <https://www.goremedical.com/>