

Sagitální řez peritoneem

- *lig. falciforme hepatis* (v jeho pokračování – *lig. coronarium dx. et sin. et lig. triangulare dx. et sin.*).
- 2. v *pars inframesocolica*:
 - *mesenterium*;
 - *mesoappendix*;
 - *mesocolon transversum* - colon transversum
 - (variabilně *mesocolon ascendens, descendens, sigmoideum a mesorectum*).

Peritoneální recesy

Peritoneální recesy jsou slepé kapsy v peritoneální dutině. Jedná se o místa možného vzniku vnitřních kýl.

1. v oblasti duodenojejunální flexury:
 - *rec. duodenalis sup. et inf. Treitz*;
 - *rec. retroduodenalis Waldayeri*;
 - *rec. paraduodenalis (sinister, venosus* – probíhá zde *v. mesenterica inf.*) *Gruberi-Landzerti*.
2. v oblasti ileocekálního přechodu:
 - *rec. ileocaecalis sup. et inf.*;
 - *rec. retrocaecalis*;
3. *recessus paracolici*;
4. *recessus intersigmoideus Treitz*.

Cievne zásobenie

cievky tých orgánov, ktoré sú ňou obalené

Nervové zásobenie

autonómne vazomotorické nervy, viscerálne je zásobené autonómne a parietálne senzitivne inervujú n.phrenicus, nn. intercostales a plexus lumbalis

Odkazy

Externí odkazy

- Peritoneum (česká wikipedie)
- Peritoneum (anglická wikipedie)

Zdroj

- ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. *Anatomie 2*. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.

Reference

1. ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. *Anatomie*. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.