

Pseudoarthrosis tibiae congenita

Kongenitální pakloub bérce (*pseudoarthrosis tibiae congenita*) je závažná vrozená vada, patří k nejobtížnějším problémům dětské ortopedie. Jde o jednostrannou poruchu normální kostní stavby distální ½ tibie, někdy i fibuly. Nesouvisí s paklouby skeletu, které vznikají jako komplikace zlomenin.

Etiologie

Příčinou je vadná diferenciací mezodermálních struktur končetiny v průběhu embryonálního vývoje. Často se vyskytuje u pacientů s neurofibromatózou.

Klinický obraz

Děti se zpravidla s pakloubem bérce již narodí, případně může vzniknout jako následek patologické zlomeniny v 1. roce věku. Typicky je přítomna zřetelná angulace bérce, zachází až do varozity a antekurvace, na rozdíl od kongenitální kyfoslózy bérce, kdy nacházíme retrokurvaci a valgusitu. Pozoruje se patologická pohyblivost

Rentgenový obraz

Existují různé klasifikace, nejužívanější je dle **Boyda**:

- **I.** – převaha přední angulace tibie (již při narození), současně další vrozené vady;
- **II.** – při narození pakloub chybí, tibie angulována a zúžena ve tvaru přesýpacích hodin, k fraktuře dochází během prvních let života, pakloub většinou sdružen s neurofibromatózou;
- **III.** – tibie cysticky změněná, přední angulace;
- **IV.** – pakloub vzniká jako únavová zlomenina ve skleroticky změněné tibii;
- **V.** – dysplázie fibuly, pakloub se vyvíjí na fibule, může být přítomen i na tibii;
- **VI.** – nález odpovídá neurofibromu nebo schwannomu, pakloub se nemusí vyvinout.

Léčba

Léčení již vzniklého pakloubu je vždy operační a velmi obtížné, jelikož kostní hojení v patologickém terénu probíhá jinak. Možnosti operací jsou: přemostění defektu kostním štěpem, tzv. spongioplastika, nitrodřeňová fixace, tzv. osteosyntéza, zevní fixace, osteosyntéza dlahou a přemostění vaskularizovaným autogenním fibulárním transplantátem – osteoperiostální štěp.

Odkazy

Použitá literatura

- SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. *Základy ortopedie*. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.
- KOUDELA, K., et al. *Ortopedie*. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.

Kongenitální pakloub bérce (Pseudoarthrosis tibiae congenita)

KONGENITÁLNÍ PAKLOUB BÉRCE - KLASIFIKACE PODLE BOYDA I-VI



VI - nález odpovídající neurofibromu či schwannomu, pakloub nemusí být vyvinut

Klasifikace dle Boyda

Klinický obraz angulace bérce, patologická pohyblivost

Příčina vadná diferenciací mezodermálních struktur končetiny v průběhu embryonálního vývoje

Klasifikace a odkazy

MeSH ID bmc98007606 (<https://www.medvik.cz/bmc/lin.k.do?id=bmc98007606>)