

# Pseudobulbární syndrom

**Pseudobulbární syndrom** je onemocnění způsobené oboustrannou lézí *tractus corticobulbaris*. Nejčastější příčiny tohoto syndromu jsou cévní mozkové poruchy a progresivní supranukleární obrna. Při jednostranné lézi je onemocnění kompenzováno druhostranným kortikobulbárním traktem.

## Projevy

Pseudobulbární syndrom se projevuje nejčastěji těmito příznaky:

- dysartrie,
- dysfágie,
- zvýšený masseterový reflex,
- často emoční a psychické poruchy (psychická labilita, bezděčný pláč či smích),
- bývá pyramidová a extrapyramidová symptomatika (frontální typ chůze).

## Frontální typ chůze

Je charakteristický pomalými a krátkými krůčky, to znamená bradybazií a brachybazií. Pacient je posturálně nestabilní a vyžaduje oporu jinou osobou. Vleže však pacient dokáže chůzi bez problémů imitovat. Vzniká z cévních příčin.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce [Frontální typ chůze](#).*

## Odkazy

### Související články

- Bulbární syndrom
- Hlavové nervy
- Bulbární a pseudobulbární syndrom (PGS)

### Použitá literatura

- AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. s. 61. ISBN 80-7262-433-4.