

# Reiterův syndrom

**Reiterův syndrom** je chorobný stav, který se řadí k reaktivním artritidám. Často se objevuje po střevním zánětu, klasicky po kampylobakterové enteritidě. Může být také součástí venericky získané chlamydiové infekce močových cest.

Často je přítomen histokompatibilní antigen HLA-B27.

## Klinický obraz

Je charakteristický triádou, do které patří:

- zánět oční spojivky – **konjunktivitida**,
- zánětlivé poškození močové trubice – **uretritida**,
- nehnisavý zánět kloubů – **arthritis**.



Kožní projevy syndromu

Mnemotechnická pomůcka: *Can't see, can't pee, can't climb a tree.*

Klasická triáda je spíše **vzácná**. Častěji se vyskytuje **nekompletní Reiterův syndrom**: artritida + 1 další příznak. Mohou být též entezipity, kožní a slizniční ulcerace, periostitidy.

## Odkazy

### Související články

- Reaktivní artritida
- Kampylobakterová enteritida
- Rod Campylobacter
- Chlamydiové infekce genitálu

### Použitá literatura

- VOKURKA, Martina a Jan HUGO, et al. *Velký lékařský slovník*. 6. vydání. 2006. 0 s. ISBN 80-7345-105-0.



#### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Reiter%C5%AFv\\_syndrom&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Reiter%C5%AFv_syndrom&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.