

SUNCT syndrom



SUNCT syndrom (**s**hort-lasting **u**nilateral **n**euralgiform attacks with **c**onjunctival injection and **t**earing) je vzácná příčina primární bolesti hlavy.^[1] Typickým pacientem je 50-ti letý muž,^[2] který má minimálně dvacet atak bolesti během dne trvající několik sekund nebo pár minut. Bolest je **jednostranná, lokalizována do orbity**, spánku a tváří s **ipsilaterálním slzením** a **konjunktivální injekcí**. Bolest může být vyvolána i pouhým dotykem na postižené straně hlavy.

Tento syndrom mohou **imitovat** nádory hypofýzy nebo zadní jámy lební a proto u pacientů s touto klinickou symptomatologií by mělo být provedeno MRI.

Terapie je symptomatická, často jen zmírňující příznaky. Podle některých studií je úspěšná léčba *lamotriginem*, *gabapentinem* a *topiramátem*.^[1]

Odkazy

Související články

- Bolesti hlavy

Externí odkazy

- SUNCT syndrom, Pubmed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12027784>)

Reference

1. BRUST, John C. M. *Current diagnosis and treatment, Neurology*. 2. vydání. Singapore : McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780071326957.
2. PAJERA, JA, AB CAMINERO a O SJAASTAD. *SUNCT Syndrome: diagnosis and treatment* [online]. [cit. 2012-12-14]. <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12027784>>.