

# Syndrom okcipitálního laloku



Je charakterizován zrakovou symptomatikou, jako jsou:

**homonymní hemianopsie,**

**korová slepota** při oboustranné lézi v oblasti fissura calcarina;<sup>[1]</sup> optokinetický nystagmus je vymizelý, zachovalá je fotoreakce<sup>[2]</sup>

- **fosfény** nebo **zrakové pseudohalucinace** vznikají při iritační lézi,
- **alexie, zraková agnózie** při lézi řečově dominantní hemisféry. <sup>[1]</sup>.

Mezi nejčastější příčiny patří trombóza či embolie v oblasti aa. cerebri posteriores.<sup>[2]</sup>

## Odkazy

### Související články

- Prefrontální syndrom
- Syndrom frontálního laloku
- Rolandický syndrom
- Syndrom parietálního laloku
- Syndrom temporálního laloku
- Funkční korové oblasti

### Reference

1. AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.