

Syndrom parietálního laloku

Syndrom parietálního laloku vzniká při postižení za *gyrus postcentralis*, kdy dochází k poruše **somestetických funkcí**.^[1] Mezi nejčastější příčiny, které vedou k rozvoji syndromu, patří ischemické cévní příhody, expanzivní procesy a mozkové atrofie (m. Alzheimer).^[2]

Symptomy^[1]

- **Astereognózie** – neschopnost rozpoznat předměty hmatem.
- **Topagnózie** – neschopnost lokalizovat senzitivní podněty.
- **Autotopagnózie** – neschopnost rozpoznat části vlastního těla.
- **Agrafestézie** – neschopnost identifikovat čísla a písmena, která se jemným škrábáním píší na kůži.
- **Alexie, agrafie, kondukční afázie** při lézi dominantní hemisféry.
- **Anosognózie, neglect syndrom** při poruše nedominantní hemisféry.
- Dále může vzniknout:
 - **apraxie,**
 - **kontralaterální porucha vibračního a polohového cití** při relativně malé poruše cití bolesti a tepla,
 - **kontralaterální hemianopsie** při lézi hlubokých partií bílé hmoty parietálního laloku,^[2]
 - **druhostranně negativní mžikací reflex,**^[2]
 - **nystagmus** směru od léze.^[2]

Odkazy

Související články

- Prefrontální syndrom
- Syndrom frontálního laloku
- Rolandický syndrom
- Syndrom temporálního laloku
- Syndrom okcipitálního laloku
- Funkční korové oblasti

Reference

1. AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.