

Venózní trombózy

Vznikají při hyperkoagulačních stavech nejrůznější etiologie (bakteriémie, sepsy, nádorová onemocnění, těhotenství a šestinedělí, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie), kolagenózy, traumata, ...), dále mohou navazovat na lokální infekci (sinusitis, otitis media). Nejčastěji bývají postižené sinus sagitalis superior, sinus transversus a sinus cavernosus.

Bolest hlavy je nejčastějším příznakem, typicky se akcentuje břišním lise. Často se rozvíjí syndrom nitrolební hypertenze a z fokální ischemie, která vzniká při poruše žilní drenáže, rezultuje řada zánikových i iritačních příznaků.

Trombóza sinus cavernosus — kruté bolesti za okem a v oku, případně v jeho okolí, nastříknutí spojivky, která může vyhřezávat před bulbus, edém papily, hemorrhagie na očním pozadí. Porucha vízu až slepota.

Trombóza sinus transversus — bolest má často maximum v oblasti mastoideálního výběžku. Klinicky dominuje syndrom nitrolební hypertenze, temporální symptomatika. Je riziko rozvoje temporálního konu.

Trombóza sinus sagitalis superior — často se objevují fokální motorické epileptické záchvaty, později parézy a následně rozvoj nitrolební hypertenze.

Diagnóza: MRI AG, angiografie.

Závažný stav s vysokým rizikem smrti nebo trvalých následků.

Terapie: heparinizace s následnou warfarinizací. Na neurochirurgii event. lokální trombolýza cestou v. jugularis do sinus transversus a sinus sagitalis superior. [zdroj?]

Odkazy

Související články

- Bolesti hlavy

Literatura



Hluboká žilní trombóza, levá noha