

# Vrozené vady vnitřního ucha

- Anomálie vnitřního ucha jsou dány poruchami formování otocysty. Poruchou vývoje otocysty vznikají různé typy hypoplázie labyrintu.

## Mondiniho anomálie

- Normální hlemýžď má 2,5 závitů. V případě **Mondiniho anomálie** má hlemýžď jen **1 závit** a vzniká zde patologická komunikace mezi scala vestibuli a scala tympani se současným rozšířením saccus a ductus endolymphaticus.
- Postižení sluchu má různý rozsah.
- Diagnostika je založena především na CT.

## Odkazy

### Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2009]. <[http://jirben2.chytrak.cz/materialy/orl\\_jb.doc](http://jirben2.chytrak.cz/materialy/orl_jb.doc)>.

### Použitá literatura

- KLOZAR, Jan, et al. *Speciální otorinolaryngologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.



### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vrozen%C3%A9\\_vady\\_vnit%C5%99n%C3%ADho\\_ucha&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Vrozen%C3%A9_vady_vnit%C5%99n%C3%ADho_ucha&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.